

FERTILIZANTE FOLIAR

VitaGrow®

Escamas

ANÁLISIS: (0-0/0-15) + 6% S + 0.1% B + 0.1% Cu + 0.1% Mn + 0.01% Mo + 0.1% Zn + 0.1% Co + 16% Ácidos Húmicos + 50% Ácidos fúlvicos

Fórmula: Humato de potasio
Ácido bórico
CoNa2 EDTA
CuNa2 EDTA
MnNa2 EDTA
Heptamolibdato de amonio
ZnNa2 EDTA
Agua

Producto Autorizado por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Número de registro 491/007

CONT. NETO:
1 kg

Lote N°: ver en el envase

Rizobacter

Registrado e importado por:
RIZOBACTER URUGUAY S.A.
25 de Mayo 467, Apto. 501 - Montevideo - Uruguay
Tel.: 29161913
www.rizobacter.com

Fabricado por:
PRO FARM OÜ C/O PRO FARM RUS LTD.
191014, St-Petersburg, Mayakovskogo str.
12 A Lit. P, Office 211, Rusia.

INDUSTRIA IMPORTADA.
País de origen: Rusia.

INTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN:

Mantener almacenado en su envase original cerrado al resguardo del sol, en lugar fresco y seco.

EXPLOSIVIDAD:

Producto no explosivo.

RIESGO TOXICOLÓGICO Y ECOTOXICOLÓGICO:

Evitar el contacto directo con el producto, utilizando adecuada protección individual. En caso de exposición cutánea, lavar la piel con agua y jabón. Evitar la contaminación de alimentos, utensilios y agua potable.

USOS RECOMENDADOS

Uso exclusivamente agrícola. Se recomienda ajustar dosis con asesor técnico.

Aplicación foliar.

Volumen de agua:

-Terrestre: 70-100 L/ha

- Aérea: 20 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO

TRIGO, CEBADA	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) 2-4 hojas (Z1.2 - Z1.4) 2) Fin de macollaje - inicio de elongación (Z3.0 - Z3.2) 3) Espigazón (Z4.9 - Z5.8)

SOJA	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) V1 - V2 2) V3 - V5 3) R1 - R2

GIRASOL	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) V4 - V5 2) R1 - R2

CANOLA	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) Roseta 2) Inicio enlongación 3) Pre-floración

MAÍZ, SORGO	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) 2-4 hojas (V2-V4) 2) 6-8 hojas (V6-V8) 3) 12-14 hojas (V12-V14)

PAPA, HORTALIZAS DE RAÍZ (remolacha, zanahoria, etc.) HORTALIZAS DE BULBO Y TALLO (cebolla, ajo, etc.)	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) 1-2 hojas 2) 10-14 días luego de la primera aplicación 3) 10-14 días luego de la segunda aplicación

ARROZ	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	1) Desde 2-3 hojas hasta inicio de macollaje 2) Desde 10 días previos a floración hasta inicio de floración

CULTIVO FORRAJERO	
DOSIS	150 g / ha
APLICACIONES	Cuando se alcance 86% de cobertura de suelo, luego de pastoreo/corte y ante situación de estrés.

Este insumo cumple con los requisitos técnicos específicos estipulados por la DGSA en Resolución N° 738.

Dirección web para acceder a información de etiquetas:

<https://www.gub.uy/ministerioganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/registro-fertilizantes>

180 mm

130 mm

130 mm

105685:01

105686:01